
内視鏡検査を受ける方へ



血栓症の発症を抑制するお薬（抗血栓薬療法）を飲んでいませんか



1、抗血栓療法を行っている方は、内視鏡検査で組織検査（生検）を行うことができません。

抗血栓薬内服中に生検を行うと、大出血を起こしトラブルとなることがあります。

2、生検を行うためには抗血栓薬を一時的に休んで（休薬）頂く必要があります。

抗血栓薬療法は、脳梗塞や心筋梗塞の再発予防などですが、休薬によって再発率が高まることを理解して頂く必要があります。

3、抗血栓薬を休んで頂くことは、内視鏡を予約した医師の指示で行われます。

休薬の安全性を保証するものではありません。事前に抗血栓薬の処方を受けている主治医と相談されるようお願いします。

4、抗血栓薬の処方を受けている方は、原則休薬せずに検査を受けて頂くことをお勧めします。

生検が必要と判断されたときに改めて検査を受けて頂くことを提案しています。
何度も内視鏡を受けることが負担とお考えになる方は、事前に主治医、検査担当医と十分ご相談してください。

5、現在服用しているお薬が分かるものを持参してください。

現在飲んでいるお薬または、お薬手帳や薬の説明書等、お薬が分かるものを持参してください。

公立置賜総合病院 院長

抗血栓薬の確認書

あなたが受ける内視鏡検査・治療日は　　月　　日です。

内視鏡検査では、服用いただいている抗血栓薬はなるべく休みません。細胞検査（生検）や治療で休んでいただく場合でも、必要最小限としています。薬を休む場合には、抗血栓薬の処方を受けている主治医ともご相談ください。

薬の代表名	ジェネリック名（後発品）	★この日から休薬し、内視鏡当日朝も休薬
●ワーファリン	（　　）→	月　日から休薬
●プラザキサ	（　　）→	月　日から休薬
●イグザレルト	（　　）→	月　日から休薬
●エリキュース	（　　）→	月　日から休薬
●リクシアナ	（　　）→	月　日から休薬
●バイアスピリン/バファリン81	（　　）→	月　日から休薬
●パナルジン	（　　）→	月　日から休薬
●プラビックス	（　　）→	月　日から休薬
●エフィエント	（　　）→	月　日から休薬
●コンプラビン	（　　）→	月　日から休薬
●タケルダ	（　　）→	月　日から休薬
●その他	（　　）→	月　日から休薬

＜ESD、ERCP、静脈瘤硬化療法のみ＞

●経口避妊薬/月経困難症治療薬（　　）→　　月　日から休薬